

1000 mm

290 mm

120 mm

360 mm

120 mm

70

35

2,5

65

650 mm

780 mm

40 mm

20 mm

370 mm

65

Druckbreite 970 mm

5

5

2,5



1000 mm

290 mm

120 mm

360 mm

120 mm

70

35

2,5

# HUMOPLANT

GRANULES



# HUMOPLANT

GRANULES



### AMMENDANTE Leonardite della Germania

Carbonio (C) organico di origine biologica sulla sostanza secca	35 %
Azoto (N) organico sulla sostanza secca	0,5 %
Sostanza organica sulla sostanza secca	70 %
Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica	40 %
Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile	60 %
pH	5,5

### CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Leonardite solo se ottenuta come sottoprodotto delle attività estrattive.

CULTURE	DOSAGGIO CON DISTRIBUZIONE		NOTE
	LOCALIZZATA	A SPAGLIO	
Orticole in serra	150 - 200 kg/ha (15 - 30 kg/1000 m <sup>2</sup> )	200 - 500 kg/ha (20 - 50 kg/1000 m <sup>2</sup> )	Distribuire prima delle operazioni di epuratura interrando il prodotto.
Orticole a pieno campo	100 - 200 kg/ha (10 - 20 kg/1000 m <sup>2</sup> )	200 - 400 kg/ha (20 - 40 kg/1000 m <sup>2</sup> )	Distribuire prima delle operazioni di epuratura interrando il prodotto.
Fragolia	150 - 200 kg/ha (15 - 30 kg/1000 m <sup>2</sup> )	250 - 500 kg/ha (25 - 50 kg/1000 m <sup>2</sup> )	Distribuire al terreno prima dell'epuratura che precede la realizzazione delle prole o localizzandola all'atto della realizzazione delle prole stesse.
Culture arboree, fruttiferi, frutta a guscio e vite	100 - 200 kg/ha	200 - 400 kg/ha	La distribuzione localizzata in banda sulla fila è consigliata solo su colture allevate a spalliera. Interare il prodotto dopo la distribuzione.
Culture arboree, fruttiferi, frutta a guscio e vite (al trapianto)	100 - 300 g/buca	400 - 800 kg/ha	Effettuare la distribuzione a spaglio in terreni poveri di sostanza organica o in seguito a sbancamenti. Interare con le epurature che seguono la lavorazione principale.
Seminativi	100 - 200 kg/ha	100 - 200 kg/ha	Distribuire il prodotto prima dell'ultima epuratura.
Culture floreali e ornamentali	200 - 400 kg/ha (20 - 40 kg/1000 m <sup>2</sup> )	300 - 500 kg/ha (30 - 50 kg/1000 m <sup>2</sup> )	Distribuire prima delle operazioni di epuratura interrando il prodotto.
Tappeti erbosi		250-500 kg/ha	Distribuire prima della semina interrando il prodotto oppure in copertura dalla primavera in avanti (facendo seguire un'irrigazione).
Vivai e preparazione di terriccati	Miscelare al 2-5% in funzione delle caratteristiche del prodotto che si vuole realizzare e della qualità dei componenti del terriccato.		

**NB:** utilizzare le dosi massime consigliate in tutti quei casi in cui si operi su terreni poveri di sostanza organica, sabbiosi, alcalini, salini o soggetti ad irrigazioni con acque salmastre, sottoposti per anni a fumigazioni e/o inquinati da metalli pesanti.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:**  
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P103: Leggere l'etichetta prima dell'uso.  
P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.  
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**  
EUH210: Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

**Fabbricante: CBC (Europe) S.r.l.**  
Via Zanica 25 - 24050 Grassano (BG)  
Tel. 035-335313

# HUMOPLANT


GRANULES



# HUMOPLANT

GRANULES

PESO NETTO  
**20 kg**



Rev. 09/2023  
Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in discarica.  
Consulta le indicazioni nazionali e del tuo comune.



PESO NETTO  
**20 kg**



PESO NETTO  
**20 kg**

PESO NETTO  
**20 kg**



370 mm

65

650 mm

780 mm

65

2,5

5

5

Druckbreite 970 mm



# HUMOPLANT

## GRANULES

### AMMENDANTE Leonardite della Germania

Carbonio (C) organico di origine biologica sulla sostanza secca	35 %
Azoto (N) organico sulla sostanza secca	0,5 %
Sostanza organica sulla sostanza secca	70 %
Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica	40 %
Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile	60 %
pH	5,5

### CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Leonardite solo se ottenuta come sottoprodotto delle attività estrattive.

CULTURE	DOSAGGIO CON DISTRIBUZIONE		NOTE
	LOCALIZZATA	A SPAGLIO	
Oricole in serra	150 - 200 kg/ha (15 - 30 kg/1000 m <sup>2</sup> )	200 - 500 kg/ha (20 - 50 kg/1000 m <sup>2</sup> )	Distribuire prima delle operazioni di epiratura interrando il prodotto.
Oricole a pieno campo	100 - 200 kg/ha (10 - 20 kg/1000 m <sup>2</sup> )	200 - 400 kg/ha (20 - 40 kg/1000 m <sup>2</sup> )	Distribuire prima delle operazioni di epiratura interrando il prodotto.
Fregola	150 - 200 kg/ha (15 - 30 kg/1000 m <sup>2</sup> )	250 - 500 kg/ha (25 - 50 kg/1000 m <sup>2</sup> )	Distribuire al terreno prima dell'epiratura che precede la realizzazione delle prose o localizzandola all'atto della realizzazione delle prose stesse.
Culture arboree, fruttiferi, frutta a guscio e vite	100 - 200 kg/ha	200 - 400 kg/ha	La distribuzione localizzata in banda sulla fila è consigliata solo su colture allevate a spalliera. Interare il prodotto dopo la distribuzione.
Culture arboree, fruttiferi, frutta a guscio e vite (al trapianto)	100 - 300 g/buca	400 - 800 kg/ha	Effettuare la distribuzione a spaglio in terreni poveri di sostanza organica o in seguito a sbancamenti. Interare con le epirature che seguono la lavorazione principale.
Seminativi	100 - 200 kg/ha	100 - 200 kg/ha	Distribuire il prodotto prima dell'ultima epiratura.
Culture floricole e ornamentali	200 - 400 kg/ha (20 - 40 kg/1000 m <sup>2</sup> )	300 - 500 kg/ha (30 - 50 kg/1000 m <sup>2</sup> )	Distribuire prima delle operazioni di epiratura interrando il prodotto.
Tappeti erbosi		250-500 kg/ha	Distribuire prima della semina interrando il prodotto oppure in copertura dalla primavera in avanti (facendo seguire un'irrigazione).
Vivai e preparazione di terriccio	Miscelare al 2-5% in funzione delle caratteristiche del prodotto che si vuole realizzare e della qualità dei componenti del terriccio.		

**NB:** utilizzare le dosi massime consigliate in tutti quei casi in cui si operi su terreni poveri di sostanza organica, sabbiosi, alcalini, salini o soggetti ad irrigazioni con acque salmastre, sottoposti per anni a fumigazioni e/o inquinati da metalli pesanti.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:**  
 P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
 P103: Leggere l'etichetta prima dell'uso.  
 P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.  
 P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**  
 EUH210: Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

**Fabbricante: CBC (Europe) S.r.l.**  
 Via Zanica 25 - 24050 Grassano (BG)  
 Tel. 035-335313

**BIOGARD**  
 Biological First.

**HUMOPLANT**  
**GRANULES**

# HUMOPLANT

## GRANULES


**BIOGARD**  
 Biological First.

**HUMOPLANT**  
**GRANULES**



**BIOGARD**  
 biological First.

PESO NETTO  
**20 kg**



Rev. 09/2023  
 Svista bene l'imballaggio del tuo prodotto prima di conferirlo in raccolta. Consulta le indicazioni nazionali e del tuo comune.

**BIO**  
 www.biogard.it

**BIOGARD**  
 biological First.

PESO NETTO  
**20 kg**



PESO NETTO  
**20 kg**



PESO NETTO  
**20 kg**